DOI:10.19577/j.cnki.issn10074406.1999.s1.034

·短篇报道·

高聚金葡素配合顺铂治疗恶性胸腔积液

张金兰 (沈阳市第五人民医院肿瘤内科 沈阳 110023)

我们应用高聚金葡素配合顺铂(DDP)治疗恶性胸腔积液,并进行了系统观察。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组64例均经细胞学或组织学确诊为中晚期肺癌。男性50例,女性14例,年龄38～70 y。患者胸腔积液均经临床及影像学、B超等证实,其中大量积液35例,中等量积液29例,单侧胸腔积液40例,双侧胸腔积液24例。

1.2 治疗方法 胸腔穿刺成功后先抽尽胸腔积液,再经穿刺针将药物注入胸腔,每次高聚金葡素(沈阳协合高科技开发有限公司)4 000 IU,DDP 60～80 mg(溶于40 ml NS)及地塞米松5 mg,分别注入胸腔,注药后嘱病人变动体位,以便药液与体腔表面充分接触,qw,一般2～3次。治疗期间,每周B超/和(或)X线复查,观察胸腔积液消长情况,并复查ECG、血象及肝肾功能等。

1.3 疗效评定 按WHO可测病灶疗效评定标准。完全缓解(CR):治疗后胸腔积液完全吸收,病灶消失,临床和影像学证实未见胸腔积液,并维持1 mo以上;部分缓解(PR):治疗后积液减少1/2以上,症状明显改善,维持1 mo以上,不再抽液;无效(NR):治疗后胸腔积液仍然继续迅速产生,或胸腔积液减少在1/2以下,症状无改善,1 mo以内必须再次抽液者。

2 结果

2.1 疗效 本组CR33例,占51.6%;PR25例,占39.1%;NR10例,占15.6%;总有效率90.6%(52/64)。

2.2 高聚金葡素的不良反应 有5例患者用药2 h后出现低热,其体温在37.8 ℃左右,不用处理4～6 h后自行退热,无胸闷、胸痛。3例出现食欲不振,轻度恶心感。全部病例未见肝、肾功能不良影响。

3 讨论

胸腔积液是晚期恶性肿瘤病人的严重并发症,临床上常见。癌性胸腔积液治疗的药物主要为抗癌药、免疫调节剂及放射性同位素等。有人报道DDP、高聚金葡素治疗恶性胸腔积液有效率分别为86.6%、70%。本组两药合用,其有效率达90.6%,明显高于单用的疗效,其原因可能是:高聚金葡素与DDP合用有协同作用;高聚金葡素有直接抑制肿瘤生长的作用,腔内注射不仅迅速促进胸腔癌性渗出液的吸收,而且对原发灶及转移灶也起一定的控制作用;腔内注入能提高局部药物浓度,增强抗癌效果。

盐酸多西环素治疗宫颈衣原体支原体感染的临床疗效

洪树勋 (昆明市第一人民医院妇科 昆明 650011)

80年代以来性病再次在我国出现,性传播疾病年发病率一直持续地增长,给人们带来一系列的病痛、并发症,甚至死亡。及时有效的治疗性疾病,不仅可以解除病人的痛苦,防止并发症的产生,而且有助于遏制性病在人群中的播散。作者对32例宫颈沙眼衣原体(*chlamydia trachomatis*,*CT*)及14例解脲支原体(*ureaplasma urealyticum*,*UU*)感染患者采用盐酸多西环素治疗,疗效满意。

1 资料与方法

1.1 对象 1998年2月～1999年2月我院妇科门诊宫颈疾病患者,临床表现为子宫颈管内膜炎,粘液脓性白带增多,宫颈水肿,下腹痛或隐痛、糜烂触血。46例均经阴道镜检查,宫颈细胞学检查或宫颈活组织取材,病理检查排除癌症、结核后,经酶联免疫吸

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net